



Harmonix®

Red Mite

Лесен за */// Прилагане*

Harmonix® Red Mite може да се прилага при домашните птици и бройлери в тяхно присъствие чрез лесно нанасяне, като се избягва стресът от преместване на птиците. Съдържа усъвършенстван целулозен полимер, обикновено използван за хранителни цели. Той прониква дълбоко в прашните слоеве, които обикновено се наблюдават в местата за отглеждане на птици, и се разпространява дълбоко в пукнатините по пода и стените, където обикновено се настаняват кокошинките. На практика целулозният полимер представлява течен лепкав капан за вредителите. Ефективността на продукта в птицефермите е повишена поради способността му да прониква в дълбочина върху запрашени повърхности. Освен помещенията за бройлерите и за снасяне на яйца, транспортното оборудване, използвано за пренасянето на птиците, също трябва да бъде третирано, тъй като това са чувствителните точки за пренасяне на кокошинките върху домашните птици.

// Помещения и домашни птици

Преди пръскане

Не е необходимо птиците да бъдат извеждани. Уверете се, че всички яйца са събрани преди обработка с **Harmonix® Red Mite**. С цел подобряване на контакта на струята с кокошинките и за да имате по-добър достъп за унищожаването им, отстранете всички капаци, колани и други принадлежности.

Доза на прилагане

Harmonix® Red Mite е концентрат.
Един литър **Harmonix® Red Mite** се разрежда със 7,5 литра чиста вода и с получения разтвор може да се третира площ от приблизително 200 m².

Подготовка на пръскачката и разтвора

Напълнете пръскачката с вода наполовина и след като изчислите каква е площта за третиране, добавете необходимото количество **Harmonix® Red Mite** и допълнете до крайния необходим обем с вода. Затворете пръскачката и се уверете, че съдържанието е добре смесено преди употреба. Разклатете или повторно разбъркайте съдържанието в пръскачката преди употреба, ако е имало прекъсване на пръскането.

Прилагане


Напомпайте пръскачката и нанасяйте на дебела струя под ниско налягане директно върху местата на струпване на кокошинки, както и в пукнатините и прашните места, където се крият или виреят паразитите. Абсорбиращите повърхности трябва да се третират по-обилно. **Harmonix® Red Mite не трябва да се пръска директно върху самите кокошки и птици.** При използването на гръбна пръскачка с ниско налягане работете на разстояние около 75 cm от повърхността за третиране. Повърхността трябва да изглежда мокра непосредствено след нанасянето.

Последващо третиране

Препоръчва се повторно прилагане на **Harmonix® Red Mite** в рамките на 7-10 дни след първото приложение или при повторна поява на паразитите.



Лице, което пуска на пазара: „БАЙЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ул. „Резбарска“ 5, София 1510; Тел.: 02/ 4247 229
Дистрибутор за България: „ВЕРМИНЕКС“ ЕООД
Централен офис: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 63
e-mail: sales@verminex.eu, тел.: +359 894 383 542



Информацията в брошурата е актуална към септември 2020 г.

За Вашата безопасност, винаги четете етикета и листовката и следвайте стриктно указанията за употреба.
Harmonix® Red Mite е регистрирана търговска марка на Bayer CropScience Ltd. © Авторско право на Bayer 2018 г.



Harmonix®

Red Mite

По-добро здраве на птиците, по-малко стрес,
по-високи печалби за фермера


*Кокошинки?
Не, благодаря.*



Кокошинки (Dermanyssus gallinae)

Основни факти

- // Кокошката е призната за най-сериозния паразит по домашните птици в Европа.
- // Пренасящата болести кокошинка присъства в широк спектър при всички птичи видове и се пренася от дивите върху върху домашно отглежданите такива.
- // Около 90% от птицефермите и постройките за домашни птици в България са заразени с кокошинки.
- // Числеността на кокошинките нараства с бързи темпове за кратко време. Ето защо навременната и адекватна реакция е от съществено значение за тяхното елиминиране.
- // Кокошката може да оцелее с месеци в латентно състояние, без да се храни, криейки се в пукнатини и цепнатини.
- // Кокошинките могат да изсмучат до 5% кръв от кокошката за една нощ.
- // Само една птица може да бъде преносител на до 500 000 кокошинки.
- // Наличието на 5000 кокошинки у една кокошка може да намалят телесното ѝ тегло с 1g на ден.
- // Жизненият цикъл на кокошката трае между 7 и 17 дни в зависимост от температурата и влажността на околната среда.



Основни предимства



Подобрява здравословното състояние на птиците

- // Намалява дискомфорта.
- // Намалява пренасянето на патогени и болести.
- // Подобрява общото здравословно състояние чрез непосредствена имобилизация.
- // Подобрява качеството на яйцата и месото.
- // Увеличава производителността.




Лесно прилагане

- // Прахообразната абсорбираща се формула прониква във всички пукнатини и цепнатини.
- // Не се изисква предписание от ветеринар.
- // Може да се нанася с обиковена пръскачка.
- // Не е класифициран като биоцид и употребата му не попада в обхвата на регулациите на Регламент (ЕС) 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.



Биозащита

- // **Harmonix® Red Mite не е биоцид**, съдържа главно метилцелулоза и е особено подходящ за стопанства, ориентирани към отглеждане на животни без употреба на конвенционални биоциди.
- // Предотвратява пренасянето на болести от кокошинките.
- // Бързият контрол върху кокошинките предотвратява бързото разрастване на популациите им.
- // Третирането на клетките за транспортиране на птиците и оборудването, използвано при отглеждането им (основни зони на зараза), намалява риска от разселването на кокошинките от една ферма в друга или от увеличаването на числеността им в рамките на едно стопанство.



Интегриран подход

- // Ценен инструмент за ефективен интегриран подход, включително за хигиена и профилактика.
- // Не се наблюдава формиране на резистентност поради физическия способ на действие.
- // Може да се използва на всеки етап от цикъла на отглеждане на птиците – преди зареждане на нова партида, при текущо почистване или за лечение на първите признаци на заразяване по птиците.
- // Ограничен остатъчен ефект. Без риск от замърсяване на месото или яйцата с химически вещества.